

Ästhetik trifft Rekonstruktion: Nasenspitzenrekonstruktion mit simultaner Nasenspitzenverkleinerung

T. Satir¹, M. Felcht¹

¹ St. Josefskrankenhaus, Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, Dermatochirurgie, Heidelberg, Baden-Württemberg, Deutschland

Inhalt

Einleitung

Die Rekonstruktion von größeren Nasenspitzendefekten ist ein häufig durchgeführter Eingriff in der Dermatochirurgie. Hierfür stehen verschiedene Lappenplastiken zur Verfügung. Um Durchblutungsproblemen zu reduzieren, haben wir eine Nasenspitzen-Rhinoplastik mit rekonstruktiven Techniken kombiniert.

Methoden

Zwischen Mai 2025 und Mai 2026 wurden insgesamt 12 kombinierte Eingriffe aus Nasenspitzenrekonstruktion und Nasenspitzenverkleinerung durchgeführt.

Ergebnisse

Durch die zusätzliche Nasenspitzenverkleinerung verlängerte sich die Operationszeit um etwa 30 Minuten. Die Nasenspitzenverkleinerung erlaubte jedoch auch bei größten Defekten die Anwendung von einfachen Lappenplastiken. In keinem Fall kam es zu einer Durchblutungsstörung. Die ästhetischen Ergebnisse waren in allen Fällen gut bis sehr gut.

Schlussfolgerung

Die Nasenspitzenverkleinerung kann gerade bei alten multimorbiden Patienten eine sinnvolle Alternative darstellen, da sie einfachere Verschlusstechniken erlaubt.